

歐利生注射液 10單位/公撮

OXYTOCIN Injection 10 I.U./ml

【成 分】 Each ml contains :

Oxytocin 10 IU

賦形劑 : Sodium Chloride, Chlorobutanol,
Ethyl alcohol, Benzyl alcohol,
Glacial Acetic acid.

【適 應 痘】

催產及減少產後出血。

【用法・用量】

1. 用於誘導分娩：劑量3IU (0.3ml) 皮下或肌肉注射，按需要每隔20~30分鐘可再同量使用或將10IU (1ml) 加入1000ml 5%葡萄糖或生理食鹽水中，予以稀釋，以每分鐘15滴由靜脈輸入。
2. 用於止血：0.6~2 IU (0.06~0.2ml) 加入3~5ml生理食鹽水中稀釋緩慢靜脈注射。

【本藥限由醫師使用】

【注意事項】

- ①本劑常於誘導分娩時應用，故對子宮收縮不能將胎兒壓出之長時間分娩病例，或引發微弱陣痛之治療目的而使用，應用本品宜極謹慎。
- ②禁忌：曾對 Oxytocin 及類似化合物有過敏症者，禁用本品。
- ③有下列情況原則上勿用：兒頭骨盤不均衡、全前置胎盤、常位胎盤早期剝離、過強陣痛、子宮迫切破裂以及胎兒窘迫等。
- ④有下列病例時，需仔細觀察母子之全身狀態，子宮收縮情形，小心使用：
 - A. 疑有胎兒窘迫者。
 - B. 妊娠中毒症，心、腎、血管障礙患者。
 - C. 疑有兒頭骨盤不均衡，曾做帝王切開術及廣範圍子宮手術者，前置胎盤及胎位胎勢異常者。
 - D. 軟產道強韌症，高齡初產婦，頻產婦。
- ⑤相互作用：
 - A. 本劑與 prostaglandin (如Dinoprost等) 併用有相乘作用，對過強陣痛患者，分娩時應十分監視，慎重投與。
 - B. 與 cyclophosphamide 併用，有增強本劑作用。
- ⑥副作用：a. 休克：虛脫異常場合，請中止使用。b. 子宮：過強陣痛、子宮破裂、頸管裂傷、羊水栓塞症、微弱陣痛、弛緩出血等現象。c. 胎兒、新生兒：胎兒窘迫，須仔細觀察，有新生兒黃疸報告。d. 循環系：不整脈，靜注後有血壓下降或血壓上升等現象。e. 消化系：噁心、嘔吐。f. 過敏症：過敏症狀出現，及水中毒症狀。
- ⑦適用上注意：靜脈注射（尤其與麻醉劑，昇壓劑等併用時）需注意血壓，緩慢行之。

【包 裝】

1ml/Amp, 100支以下盒裝。

東洲化學製藥廠股份有限公司

ORIENTAL CHEMICAL WORKS INC.

新北市蘆洲區中山二路195巷12號

電話：(02)2281-5252 傳真：(02)2281-8282

委託瑞士藥廠股份有限公司新市廠製造

台南市新市區中山路182號



Oriental®