

"生達" 舒肌痛[®] 膠囊

SOMA[®] Capsules "Standard"

成份：每一膠囊含有：

Acetaminophen.....	250mg
Chlorzoxazone.....	150mg
Caffeine Anhydrous.....	20mg
Thiamine Disulfide.....	7.7mg

主治效能：關節痛、肌肉痛、顏面神經痙攣、神經痛、關節周圍炎、捻挫打撲及其他肌肉之痙攣、強直及疼痛等諸症。

用法用量：通常成人每次服一粒，一日三次，於飯後服用。
兒童酌減。本藥須由醫師處方使用。

警語及注意事項：

1.肝毒性:

(1)使用acetaminophen (paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部分發生肝臟損害之病例係因使用超過每日4,000毫克的acetaminophen所致，且多涉及使用超過一種以上含acetaminophen成分之藥品。

(2)過量服用acetaminophen可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有acetaminophen成分之藥品，因而造成用藥過量。

(3)有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用acetaminophen期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有acetaminophen或paracetamol成分，不可同時使用超過一種以上含有acetaminophen成分之藥品。如果一天誤服超過4,000毫克的acetaminophen即使並未感覺不適，也應立即就醫。

2.與酒精併用: 不得併服含酒精飲料，因為acetaminophen可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用acetaminophen而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。

3.過量:

(1)服用過量acetaminophen會在服藥24小時內看到初期症狀，可能包括:胃腸不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。

(2)本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。

(3)Acetaminophen過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括:噁心、嘔吐、出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後48~72小時才明顯可見。

4.過敏/過敏性反應: 上市後曾有發生與使用acetaminophen相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對acetaminophen過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。

5.嚴重皮膚反應: 使用acetaminophen的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿疱病(Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP)史蒂文生氏-強生症候群(Stevens-Johnson Syndrome, SJS)和毒性表皮壞死溶解症(Toxic Epidermal Necrolysis, TEN)病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

賦形劑：Lactose Dried、Magnesium Stearate、Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Purified Water、Indigo Carmine、Glycerine、New Coccine、Brilliant Blue FCF、Sunset Yellow FCF、Titanium Dioxide、Tartrazine

貯存條件：25℃以下儲存。

包裝：6~1000粒鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

衛署藥製字第036749號

藥商：



PIC/S GMP藥廠

生達化學製藥股份有限公司

台南市新營區土庫里土庫6之20號

製造廠：PIC/S GMP藥廠

盈盈生技製藥股份有限公司 三峽廠

新北市三峽區紫新路26巷6號