

# 優麗舒™保濕型單支裝點眼液

## Optive Fusion® Lubricant Eye Drops (Unit Dose)

衛部藥輸字 第 026926 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2024-04-09

優麗舒™保濕型單支裝點眼液(Optive Fusion® Lubricant Eye Drops Unit Dose) · 可暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感 · 亦可暫時緩解因配戴隱形眼鏡造成之不適。

### 1 成分

#### 1.1 有效成分及含量

每ml含Carboxymethylcellulose Sodium (Type 7LFPH) 5mg · Glycerin 10 mg

#### 1.2 其他成分(賦形劑)

Sodium Hyaluronate, Erythritol, Levocarnitine, Sodium Lactate, Potassium Chloride, Calcium Chloride Dihydrate, Magnesium Chloride Hexahydrate, Sodium Hydroxide/ Hydrochloric Acid, Purified Water

### 2 用途(適應症)

暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。暫時緩解因配戴隱形眼鏡造成之不適。

### 3 使用上注意事項

#### 3.1 有下列情形者 · 請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

#### 3.2 有下列情形者 · 使用前請洽醫師診治

3.2.1 正在接受醫師治療或醫師處方眼藥的人。

#### 3.3 其他使用上注意事項

3.3.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.3.2 避免陽光直射 · 宜保存陰涼之處。

3.3.3 使用前 · 請洗淨雙手。

3.3.4 請依照藥品標示使用。

3.3.5 請勿吞食本品。

3.3.6 以下情形 · 請勿繼續使用：

(1) 超過保存期限的眼藥水。

(2) 藥液混濁、變色或出現異物時。

3.3.7 首次使用前 · 須注意包裝且未拆封 · 方可使用。

3.3.8 可回蓋式不含防腐劑拋棄式小包裝眼藥水 · 須24小時內使用完畢 · 未使用完之溶液請勿繼續使用。

3.3.9 為避免污染藥品或傷及眼睛，使用時請勿碰觸藥瓶瓶口或直接碰觸到患眼，並避免與他人共用，或以其他容器盛裝

3.3.10 如需同時使用兩種以上眼藥時，請依下列方式使用，以免影響藥效：

(1) 使用眼藥水與眼藥膏時，請先使用藥水，間隔10分鐘以上再用藥膏。

(2) 使用兩種眼藥水時，建議間隔5分鐘以上。

3.3.11 使用本藥後可能出現短暫視力模糊的現象，而影響駕車或操作機械的能力。應等視力恢復清晰後再行駕車或操作機械。

3.4 下列副作用為本藥上市後自發性通報，無法確定其人數及發生頻率：

**視覺異常**

眼睛刺激感、眼睛充血、眼睛痛、眼睛癢

**中毒與醫療傷害**

眼睛表面損傷

4 用法用量

需要時使用	每次1至2滴
-------	--------

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.1.1 連續使用三天症狀沒有改善。

5.1.2 使用後產生眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。

5.1.3 若有任何不適情況產生。

5.1.4 產生過敏性反應。

6 包裝

0.4毫升LDPE塑膠瓶裝，100支以下盒裝

7 儲存條件

25°C以下, 未使用之單支裝點眼液應存放原包裝內。

8 保存期限

標示於外盒。

譯自CCDS V5.0 TW1

**製造廠**

: Allergan Pharmaceuticals  
Ireland

製造廠址：Castlebar Road, Westport, County Mayo, Ireland

**藥商**

: 瑞士商艾伯維藥品有限公司台灣  
分公司

地址：台北市民生東路三段49、51號15樓

電話：(02)25039818